

**MOLUSQUICIDA**  
**CEBO GRANULADO**  
**CIBUS-M®**  
**MATA BABOSAS Y CARACOLES**



## COMPOSICIÓN:

metaldehído: 2,4,6,8 - tetrametil - 1,3,5,7 - tetraoxaciclo-octano.....	4 g
coadyuvantes csp.....	100 g

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito en SENASA Nº: 33.872

Lote Nº: Cont.Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

**NO INFLAMABLE**

### Registrado y elaborado por:

ACAY AGRO S.A.

Calle 147 y Vecinal

(7620) Balcarce

Prov. de Buenos Aires. República Argentina

info@agri.global www.agri.global

## PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

## MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

No aplicar en el interior de la vivienda. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la contaminación de los alimentos. Usar guantes y ropa protectora adecuada (mameluco) durante la aplicación. Después de su uso lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

## RIESGOS AMBIENTALES

PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA PECES: evitar contaminar fuentes de agua.

PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA AVES.

Virtualmente no tóxico para abejas, de cualquier modo no entraña riesgos dada su formulación y modo de uso.

## TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Usar cantidades de producto ajustadas, de manera de evitar grandes excedentes. Cuando el contenido del envase es utilizado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito ubicado en lugar aislado, protegido de factores climáticos.

## TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

LOS ENVASES VACÍOS NUNCA DEBEN SER REUTILIZADOS SINO APROPIADAMENTE DESTRUIDOS POR PERFORACIÓN O COMPACTACIÓN. Una vez vacíos, inutilizarlos y colocarlos en tambores o contenedores, en lugar seguro hasta su traslado a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final.

## ALMACENAMIENTO

Conservar el envase cerrado en lugar bien seco y fresco.

## DERRAMES

En caso de derrame del producto, barrer y juntar el producto y colocarlos en contenedores identificados para su envío y posterior destrucción por Empresas autorizadas.

## PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado, colocar al afectado al aire libre y fresco, lejos de la zona de contaminación. Si persiste la dificultad respiratoria, procurar a un médico.

En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

Procurar un médico si la irritación persiste.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. Si persiste la irritación requerir atención médica.

## ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

**PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE IV  
NO TIENE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO. PRODUCTO MÍNIMAMENTE IRRITANTE OCULAR. NO IRRITANTE DERMAL. NO SENSIBILIZANTE.**

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

Dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, palpitaciones, temblores, cianosis.

## ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES

No posee.

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños de Bs. As. Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital de Clínicas de la Fac. de Medicina (UBA). Centro Toxicológico. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Haedo, Pcia de Bs. As. Tel.: (011)4654-6648 y 4658-7777.
- Hospital de Niños. Ciudad de Córdoba, Córdoba -Tel.: (0351) 433303.
- Hospital Sor M. Ludovica, La Plata. Tel. (0221) 4515555.

## GENERALIDADES

CIBUS-M® es un cebo tóxico listo para su uso, que se representa en forma de granulado lo que facilita su aplicación. Actúa por ingestión tanto para babosas como para caracoles

## INSTRUCCIONES PARA EL USO. PREPARACIÓN

No requiere preparación alguna, se trata de una formulación que se presenta lista para usar.

## EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplicar, expandir o arrojar sobre la superficie del terreno en forma uniforme y al voleo, momentos antes de la siembra, de acuerdo a la presencia o actividad de la plaga.

## RECOMENDACIONES DE USO

Babosa Gris (*Deroceras Reticulatum*) - Babosa Negra (*Arion Hortensis*) - Babosas (*Limax spp.* y *Milax spp.*)

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo, Cebada Centeno, Hortalizas y Frutillas.	5-7 Kg/ha	Al observarse los primeros signos de daños. Mejores resultados se observan en aplicaciones preventivas.
Girasol, Maíz Soja.	5-7 Kg/ha	En el momento de la siembra.
Algodón y Maní.	6-8 Kg/ha	En el momento de la siembra.

## RESTRICCIONES DE USO

Por su recomendación de uso, no presenta período de carencia.

## COMPATIBILIDAD

No se recomienda su mezcla con otros productos.

## FITOTOXICIDAD

No presenta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

### NOTA:

ACAY AGRO S.A. garantiza la calidad de este producto. Sin embargo, puesto que su almacenamiento, manejo y aplicación escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios generados por un uso distinto al indicado en este marbete.



Banda toxicológica Verde PANTONE 347 C.